

تعیین کیفیت علوفه *Agropyron libanoticum Hack* در مراحل مختلف فنولوژی

سید اکبر جوادی^{۱*}، شادی محمد پوری نعیم^۲، حسین ارزانی^۳ و احمد احمدی^۴

*- نویسنده مسئول، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیک: sadynan@yahoo.com

- دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

- استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

- مرتبی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

تاریخ دریافت: ۸۹/۰۹/۰۱ تاریخ پذیرش: ۸۹/۰۳/۰۱

چکیده

تعیین کیفیت علوفه گونه‌های موجود در مرتع از مهمترین عواملی است که جهت محاسبه ظرفیت چرایی و مدیریت صحیح مرتع لازم و ضروریست. در این تحقیق کیفیت گونه گیاهی *Agropyron libanoticum* در سه مرحله فنولوژیک در دره نظر ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. بعد از نمونه‌برداری نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل گردید. شاخصهای کیفی دیواره سلولی منهای همی‌سلولز (*ADF*)، درصد ماده خشک قابل هضم (*DMD*)، انرژی متabolیسمی (*ME*) و پروتئین خام (*CP*) اندازه‌گیری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد تفاوت معنی داری در فاکتورهای مورد اندازه‌گیری در (سطح احتمال ۱٪) در مراحل مختلف فنولوژی وجود دارد. در این گونه کیفیت علوفه در مرحله رویشی بیشتر از کیفیت علوفه در مرحله گلدهی و بذردهی می‌باشد. البته میزان پروتئین خام این گونه از آغاز تا پایان رویش روند کاهشی دارد و تفاوت میانگین آن، در رشد فعال با گلدهی و بذردهی معنی دار است.

واژه‌های کلیدی: *Agropyron libanoticum* کیفیت علوفه، مراحل رویشی، تولید، دره نظر، ارومیه.

مقدمه
مختلف متفاوت است؛ آگاهی از ارزش غذایی گونه‌ها در مراحل مختلف رویشی برای تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی بهویژه گونه‌هایی که استفاده‌های علوفه‌ای دارند از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین برای اصلاح مرتع و تعیین بهترین زمان مناسب ورود دام به مرتع و حفظ ذخایر ژنتیکی مطالعه کیفیت علوفه امری ضروری می‌باشد. تحقیقات انجام شده تفاوت ارزش غذایی گیاهان

حفظ گیاهان مرتعی همزمان با بهره‌برداری بهینه از ظرفیت بالفعل آنها یکی از راهکارهای اساسی اعمال مدیریت صحیح بر مرتع است و آگاهی از اکولوژی، کیفیت و ارزش غذایی گونه‌های موجود در مرتع جهت تعیین ظرفیت چرایی امری ضروریست و از آنجایی که نسبت اندامهای گونه‌های مرتعی در مکانها و زمانهای

انتشار جغرافیایی گونه گیاهی *libanoticum* در ارتفاعهای ۲۶۰۰-۲۰۰۰ متری استان اربیل عراق و همچنین ترکیه، قفقاز، لبنان و در ایران، استان آذربایجان بخصوص شمال غربی خوی، دیوان دره و سقز در کردستان، بخشهایی از استان تهران، آبریز جنوبی کندوان، دامنه‌های غربی و جنوبی وانگه رود و جاده لشکرک گزارش شده است (مسیبی، ۱۳۷۵). با توجه به اینکه عوامل مختلفی روی کیفیت و ارزش غذایی علوفه (ازجمله رویش گیاه) اثرگذار است، بنابراین در این تحقیق سعی گردید کیفیت علوفه *Agropyron libanoticum* در سه مرحله رویش با یکدیگر مقایسه شود تا بتوان در مدیریت چرا تصمیم بهتری اتخاذ کرد.

مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه

برای مطالعه کیفیت علوفه این گونه، دره نژ واقع در استان آذربایجان غربی جنوب شهرستان ارومیه انتخاب گردید. مساحت منطقه مورد مطالعه ۴۷۰ هکتار است. طول جغرافیایی منطقه "۲۱°۰۸'۰۸" تا "۲۶°۴۵'۱۱" و عرض آن "۳۷°۱۵'۰۳" تا "۳۷°۱۶'۵۴" می‌باشد. میزان بارندگی سالیانه ۲۶۷/۹ میلی‌متر و متوسط درجه حرارت سالیانه ۱۰/۸ درجه سانتی گراد می‌باشد. به طوری که بیشترین میزان بارندگی در دی‌ماه و کمترین بارندگی در شهریور ماه اتفاق می‌افتد. حداقل مطلق دما برابر با ۳۶/۳۲ درجه سانتی گراد مربوط به مرداد ماه و حداقل مطلق دما برابر با -۱۲/۹۲ درجه سانتی گراد در دی‌ماه است. اقلیم منطقه براساس روش آمبرژه نیمه خشک سرد می‌باشد. بافت خاک از نوع سیلیتی، کلی، لوم بوده و اسیدیته آن (PH) بین ۷/۳۵ و ۷/۱۰ و هدایت الکتریکی آن بین ۰/۳۳ تا ۰/۸۶ متغیر است.

را در مراحل مختلف رشد نشان می‌دهد. ابرسجی (۱۳۷۵) تجزیه شیمیایی گونه‌های *Aeluropus lagopoides* و *Aeluropus littoralis* از خانواده گرامینه را در سه مرحله رویشی، گلدهی و رسیدن بذر انجام داد که میزان پروتئین خام به ترتیب در گونه *Aeluropus lagopoides* برابر ۷/۸۸، ۱۱/۲، ۱۲/۲۷ و در گونه *Aeluropus littoralis* برابر ۵/۷۵ درصد بوده است، که در هر گونه با افزایش سن گیاه از میزان پروتئین آن کاسته شده است. بدرزاده (۱۳۷۹) میزان ADF گونه *Alopecurus arundinaceus* مرحله رویشی ۳۳/۵ تا ۴۴/۹ گزارش نمود که با افزایش سن گیاه میزان ADF افزایش پیدا می‌کند.

Pinkerton (1996) معتقد است که هضم‌پذیری علوفه رابطه مستقیمی با ویژگیهای دیواره سلولی دارد، زیرا محتویات درون سلولی گیاهی را می‌توان تا ۱۰۰ درصد هضم‌پذیر دانست که حتی با بالارفتن سن گیاه و یا رشد تغییری در هضم‌پذیری آن بوجود نمی‌آید، در حالی که ساختار شیمیایی دیواره سلولی با رشد گیاهان تغییر می‌نماید و با کهولت گیاه محتویات فیبر در کل گیاه افزایش یافته و در نتیجه از میزان هضم‌پذیری گیاهان کاسته می‌شود.

با توجه به افزایش نقش تغذیه در اقتصاد دامپروری، محققان و متخصصان علوم دامی به شناسایی ارزش غذایی خوارکها و تعیین احتیاجهای غذایی حیوانهای مزرعه‌ای در قرن اخیر توجه کافی نموده و تحقیقهای بی‌شماری در این زمینه انجام داده‌اند. در میان گیاهان علوفه‌ای، خانواده گرامینه برای مطالعه انتخاب گردید. از این خانواده گیاه چمن گندمی لبنانی که در منطقه نژ ارومیه پراکنش وسیعی دارد و تیپ گیاهی را در مرتع شکل داده است و بهدلیل عملکرد و سازگاری خوب انتخاب گردید.

به آزمایشگاه انتقال و با استفاده از روش‌های استاندارد و معمول، فاکتورهایی از قبیل دیواره سلولی منهای همی‌سلولز^۱ (*ADF*)، درصد ماده خشک قابل‌هضم^۲ (*DMD*)، انرژی متابولیسمی^۳ (*ME*) و پروتئین خام^۴ (*CP*) اندازه‌گیری گردید، که تمامی روشها مطابق با دستورالعمل تجزیه و تحلیل شیمیایی گیاهان و خوراک دام^۵ (*A0AC*) می‌باشد. برای بررسی پوشش گیاهی در منطقه از پلاتهای ۴m×4m که اندازه آن از روش حلقه‌نی محاسبه شد استفاده گردید. همچنین تراکم و درصد پوشش گیاهی در داخل پلاتها برآورد گردیده و میزان تولید علوفه نیز از طریق روش قطع و توزیع تعیین شد.

در ادامه بهمنظور تعیین نوسان مقادیر مورد نظر در مراحل مختلف رشد از روش آماری طرح کامل تصادفی با استفاده از نرمافزار *MSTATC* استفاده شد و برای مقایسه و دسته‌بندی مقادیر در مراحل مختلف، از آزمون دانکن استفاده شد.

از گیاهان همراه این گونه گرامینه‌های نظیر *Bromus tomentellus*, *Psathyrostachys fragilis*, *Agropyron elongatum*, *Alopecurus textilis* و *Festuca ovina* و *Agropyron cristatum* مانند *Scariola orientalis* و *Ferula ovina* می‌توان اشاره کرد. گونه مورد بررسی از لحاظ خوشخوراکی متوسط و طی مراحل رشد از میزان خوشخوراکی کاسته شده و کمتر مورد رغبت و مصرف دام قرار می‌گیرد. به طوری که عموماً پس از پایان چرا بر روی اغلب ساقه‌ها مقدار زیادی بذر باقی مانده که حکایت از عدم چرا و استفاده دام دارد.

روش بررسی

بهمنظور تعیین ارزش غذایی و کیفیت علوفه *Agropyron libanoticum* در هر یک از مراحل رشد رویشی، گله‌هی و رسیدن بذر، اقدام به نمونه‌برداری از اندام‌های هوایی گیاه (برگ و ساقه) به‌طور تصادفی گردید. تعداد پنج نمونه ترکیبی در هر مرحله در پاکت‌های مخصوص قرار گرفت و



شکل ۱- گیاه *Agropyron libanoticum* در مرحله گله‌هی

1-Acid Detergent Fiber

2-Dry Matter Digestible

3-Methabolizm Energy

4-Crude protein

5-Association of Official Analytical Chemists



شکل ۲- گیاه *Agropyron libanoticum* داخل درز سنگها با خاک بسیار اندک

برای گونه *Agropyron libanoticum* در سطح احتمال

۱٪ دارای تفاوت معنی‌دار در مراحل مختلف رویشی می‌باشد (جدول ۱).

نتایج
نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که شاخصهای کیفی علوفه (پروتئین خام، انرژی متابولیسمی، هضم پذیری ماده خشک دیواره سلولی منهای همی‌سلولز)


جدول ۱- تجزیه واریانس عامل‌های مورد اندازه‌گیری

نتایج	F مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	منابع تغییر	خصوصیات
۹۲۹/۹۹	۲۶۵/۶۴۶	۱۲۶/۲۲۸	۲	بین گروه‌ها	دیواره سلولی منهای همی‌سلولز
		۱/۲۶۳	۱۲	درون گروه‌ها	
۲۶۵/۹۱۶	۳۶۷/۹۳۲	۲۳۲/۷۹	۲	بین گروه‌ها	ماده خشک قابل هضم
		۰/۸۷۶	۱۲	درون گروه‌ها	
۲۶۵/۹۱۶	۳۶۷/۹۳۲	۶/۷۲۸	۲	بین گروه‌ها	انرژی متابولیسمی
		۰/۰۲۵	۱۲	درون گروه‌ها	
۳۶۷/۹۳۲	۳۶۷/۶۵۳	۵/۳۷۵	۲	بین گروه‌ها	نیتروژن
		۰/۰۱۵	۱۲	درون گروه‌ها	
۳۶۷/۶۵۳		۲۰۹/۹۳۰	۲	بین گروه‌ها	پروتئین
		۰/۵۷۱	۱۲	درون گروه‌ها	


: وجود اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ٪۱

سلولی منهای همی‌سلولز کمتری دارد (شکل ۷). در نمودارها حروف مشابه عدم تفاوت معنی‌دار و حروف غیرمشابه تفاوت معنی‌دار در سطح ۰/۱٪ را نشان می‌دهد.


همچنین مقایسه میانگینها نشان داد که گونه مورد بررسی در مرحله رشد اندامهای روینده نسبت به مراحل فنولوژی دیگر، پروتئین خام، نیتروژن، انرژی متابولیسمی، هضم‌پذیری ماده خشک بیشتر (شکل ۳ تا ۶) و دیواره




شکل ۳- مقایسه مقادیر %N در مراحل سه‌گانه رویشی




شکل ۴- مقایسه مقادیر %CP در مراحل سه‌گانه رویشی



شکل ۵- مقایسه مقادیر %DMD در مراحل سه‌گانه رویشی



شکل ۶- مقایسه مقادیر %ME در مراحل سه‌گانه رویشی



شکل ۷- مقایسه مقادیر %ADF در مراحل سه‌گانه رویشی

شاهمرادی (۱۳۸۳) گزارش کردند که همگام با بلوغ گیاه درصد وزن خشک، فیبر، لیگنین و *ADF* افزایش می‌یابد. پروتئین خام این گونه در مراحل مختلف رشد متفاوت بود. میزان پروتئین در مرحله رویشی با میانگین $15/93\%$ بیشتر از مراحل گلدهی و بذردهی بود. مشاهده‌ها نشان داد که مرحله رشد تأثیر زیادی بر میزان پروتئین خام در این گیاه داشته و به تدریج که گیاه رشد می‌کند، مقادیر پروتئین خام کاهش می‌یابد. باستانی و همکاران (۱۳۸۳) و Arzani *et al.*, (2004, 2006) بیان داشته‌اند که کیفیت و ارزش غذایی گیاهان با پروتئین خام، هضم‌پذیری ماده خشک و انرژی متابولیسمی نسبت مستقیم و با *ADF* نسبت معکوس دارد، که با نتایج این مطالعه هم خوانی دارد.

مقیمی (۱۳۸۴) گزارش کرد که پروتئین خام گونه *Agropyrum cristatum* در مراحل مختلف رشد متفاوت و میزان پروتئین این گونه در مرحله رویشی با میانگین $11/5\%$ بیشتر از مراحل گلدهی و بذردهی بوده است.

انرژی متابولیسمی گونه مورد نظر در هر سه مرحله رشد تفاوت داشت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین آنها وجود دارد، به‌طوری‌که در مرحله رویشی، گیاه از میزان انرژی بالاتری برخوردار است. در مورد هضم‌پذیری علوفه گیاهان مرتعی، مرحله رشد گیاه از عوامل مهم و تأثیرگذار می‌باشد، زیرا قابلیت هضم علوفه بستگی به محتویات داخل سلول و دیواره سلولی دارد. کاهش در قابلیت هضم گیاه در نتیجه کامل شدن دوره رشد منجر به کاهش انرژی قابل متابولیسم و انرژی خالص گیاه می‌شود. افزایش الیاف خام باعث کاهش پروتئین، انرژی متابولیسمی و درنهایت کاهش ارزش غذایی گیاهان می‌شود.

این گیاه از اوآخر اسفندماه به‌علت گرم شدن هوا و کاهش رطوبت، شروع به جوانهزنی و رشد ابتدایی نموده و با گذشت زمان، به‌علت بالا رفتن درجه حرارت نیز مراحل رشد رویشی خود را تا اواسط اردیبهشت ادامه داده، سپس اوآخر خرداد وارد مرحله گلدهی می‌شود، که مرحله گلدهی آن نیز تا اوایل تیرماه طول کشیده و گیاه به رشد کامل گلدهی خود می‌رسد. بعد از گذشت این مرحله گیاه وارد مرحله بذردهی و تولید بذر می‌شود که مرحله تولید بذر تقریباً از اواسط تیرماه شروع می‌شود و تا اوآخر تیرماه ادامه می‌یابد و ریزش بذر از اوایل مرداد تا اواسط مرداد انجام می‌گیرد. پس از گذشت این مرحله دچار رکود و خواب تابستانی می‌شود. شروع رشد پاییزه عموماً اوایل مهر با توجه به شرایط رطوبتی و حرارتی اکثرآ تا نیمه دوم آبان‌ماه به طول می‌انجامد و اوآخر پاییزه شروع خواب زمستانه است.

براساس نتایج بدست‌آمده تراکم گیاه *Agropyrum libanoticum* معادل $0/21$ در منطقه که شامل 2100 پایه در هر هکتار می‌باشد. متوسط پوشش یک پایه از گیاه در کل منطقه نه درصد بوده و درصد پوشش در کل منطقه $89/1$ می‌باشد. بنابراین میزان تولید این گونه به‌طور متوسط $170/29$ کیلوگرم در هکتار اندازه‌گیری شد.

بحث

نتایج بدست‌آمده از تجزیه شیمیایی نشان داد، در مرحله رشد رویشی برگ‌ها و ساقه‌ها سرسبز هستند و ماده خشک کمتری دارند؛ اما با پیشرفت رشد و بالغ شدن گیاه، بر مقادیر کربوهیدراتهای ساختاری افزوده شده، در نتیجه درصد ماده خشک گیاه افزایش می‌یابد. بشری و

دامداران علاوه بر مقدار علوفه، کیفیت و تغییرات آن را در زمانهای مختلف مورد توجه قرار دهند.

منابع مورد استفاده

- ابرسنجی، ق.، ۱۳۷۵. بررسی رویشگاههای *Aeluropus spp* در مراعع شور و قلیایی استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- باگستانی، ن.، ارزانی، ح.، زارع، م. و عبداللهی، ج.، ۱۳۸۳. مطالعه کیفیت علوفه گونه‌های مهم مراعع استپی پشتکوه یزد. فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان، ۱۱(۲):۱۳۸-۱۶۲.
- بدرزاده، م.، ۱۳۷۹. تعیین و بررسی ترکیبیهای شیمیایی و انرژی خام پنج گونه از گیاهان مرتعی غالب سبلان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- بشری، ح. و شاهمرادی، اع.، ۱۳۸۳. آت‌اکولوژی سه گونه مرتعی *Ferula gumosa* و *Stipa hohenackeriana* و *Artemisia sieberi* در اکوسیستم‌های مرتعی استان قم. فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان، ۱۱(۳):۲۸۷-۳۰۷.
- مسیبی، م.، ۱۳۷۵. بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک گونه‌های *Agropyron intermedium* و *Agropyron libanoticum* در حوزه آبخیز سد امیرکبیر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
- مقیمی، ج.، ۱۳۸۴. معرفی برخی گونه‌های مهم مرتعی مناسب برای توسعه و اصلاح مراعع ایران. انتشارات آرون، ۶۶۹ صفحه.
- Arzani, H., Kaboli, S.H., Nikkhah, A. and Jalili, A., 2004. An Introduction of Most Important of indices for Determination of Nutritive value of Range Plants. Iranian Journal of Natural Resources, 57(2):777-787.
 - Arzani, H., Basiri, M., Khatibi, F. and Ghorbani, G., 2006. Nutritive value of some Zeros Montatin rangeland species. Small Ruminant Research, 40:139-148.
 - Arzani, H., Mosayebi, M. and Nikkhah, A., 2006. An Investigation of the Effects of phonological stages on Forage quality in Different species in Taleghan Summer Rangelands. Iranian Journal of Natural Resources, 59(1):251-260.
 - Oddey, V.U., Roberts, G.E. and Low, S.G., 1983. Prediction of In -vivo Dry Matter Digestibility from the Fiber and Nitrogen Content of a Feed Common Wealth Agriculture Bureux. Australia, 295-298.

Uniyal *et al.*, (2005) خاکستر، لیگنین، فیبر و سلولز را جزء فاکتورهای کاهنده و پروتئین خام و ارزش کالری بیشتر را فاکتورهای افزایش‌دهنده کیفیت علوفه معرفی نموده‌اند. بدرزاده (۱۳۷۹) گزارش کرد که انرژی گونه مرتعی *Alopecurus arundinaceus* در مرحله رشد فعال بیشتر از مرحله گلدهی و بذردهی می‌باشد.

میزان *ADF* این گونه در هر سه مرحله رویشی متفاوت بود. مقدار آن در مرحله گلدهی و بذردهی با میانگین ۳۸/۵۹ و ۳۸/۳۵٪ بیشتر از مرحله رویشی (۳۱/۶۰٪) بوده‌است. زیرا همزمان با افزایش سن گیاه، دیواره سلولی ضخیم‌تر و خشبي‌تر شده، به‌طوری‌که بر میزان الیاف خام و لیگنین آن افزوده می‌شود. این تغییرها اصولاً حاصل توسعه مواد هیدرات کربنی ساختمانی است که عمدتاً از سلولز، همی‌سلولز و لیگنین تشکیل می‌شوند و با افزایش حجم گیاه دوام آن ضروریست. این تغییرها تحت تأثیر مرکب دو عامل، یعنی افزایش نسبت ساقه به برگ و افزایش مواد هیدرات کربنی ساختمان با افزایش سن گیاه می‌باشد. بنابراین همگام با بلوغ گیاه درصد وزن خشک، فیبر و لیگنین افزایش می‌یابد که مطابق با نتیجه بشری و شاهمرادی (۱۳۸۳) می‌باشد. و همچنین میزان هضم‌پذیری *ADF* گیاه نیز با قسمتهای مختلف دیواره سلولی بخصوص طبق فرمول بدست‌آمده توسط oddey *et al.*, (1983) رابطه زیادی دارد. به‌طوری‌که با افزایش رشد گیاه و در نتیجه افزایش *ADF* هضم‌پذیری کاهش می‌یابد. نتایج بدست‌آمده نشان‌دهنده اختلاف در ارزش غذایی گونه گیاهی *Agropyron libanoticum* در مراحل مختلف رشد می‌باشد، به‌طوری‌که در مراحل رشد رویشی و گلدهی از کیفیت و ارزش غذایی بالاتری برخوردار می‌باشد. بنابراین برای برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مناسب از علوفه، لازم است

- Mathew, W., 1986. Early Use of Crested Wheatgrass Seeding In: Johnson, Kendall L., ed. *Crested Wheatgrass: its Values, Problems and Myths: Symposium Proceedings, 1983Oct.3-7, logan, UT.* logan ,UT: Utah State University: 27 – 28.[1551].
- Pinkerton, B., 1996. "Forage Quality", Crop & Soil Environment Science College.
- Uniyal, S.kr., Awasthil, A. and Rawat, G.S., 2005. Biomass availability and Forage quality of *Eurotia ceratoides* Mey in the rangelands of Changthang, eastern Ladakh. Current Science, 89(1),10 July.

Determination of forage quality of *Agropyron libanoticum* *Hack* at different phenological stages

Javadi, S.A.*¹, Mohamad pori naeem, s.h.², Arzani, H.³ and Ahmadi, A.⁴

1*- Corresponding Author, Assistant professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
Email: sadynan@yahoo.com

2- M.Sc. Student in Rangeland Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3-Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

4- Research Instructor, Research Center for Agriculture and Natural Resources, West Azerbaijan, Urmia, Iran.

Received: 22.05.2010

Accepted: 22.11.2010

Abstract

Determination of forage quality of rangeland species is one of the fundamental factors for evaluation of grazing capacity and management of rangelands. In this study, forage quality of *Agropyron libanoticum* was compared in three phenological stages in Nejh valley, Urmia. After sampling, quality indices such as ADF, CP, ME and DMD were measured in laboratory. Results showed that there were significant differences among the growth stages (at 1 % level of probability). Forage quality of vegetative growth stage was higher than that of flowering and seed ripening stages. Crude protein content decreased from early growth to the end of growth and there was significant difference among vegetative growth stage and flowering as well as seed ripening stage.

Key words: *Agropyron libanoticum* hock, forage quality, phenological stages, production, Urmia, Nejh valley.