

بررسی تأثیر مقدار بذر و فاصله کاشت در عملکرد علوفه پوترویوم (*Sanguisorba minor Scop.*)

عباسعلی سند گل^۱

چکیده:

پوترویوم (*Sanguisorba minor Scop.*) یکی از گونه های مرغوب ترکیب گیاهی مراتع طبیعی کوهستانی است و کاشت آن در آب و هوای معتدل و خاکهای حاصلخیز منطقه گرگان از عملکرد قابل توجهی برخوردار است. از این روی لازم بود تا مسائل بهزیستی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بذر و فاصله کاشت مناسب جهت حداقل تولید علوفه در ایستگاه چالکی گرگان با بارندگی ۴۵۰ تا ۶۵۰ میلیمتر در سال انجام گرفت. در این تحقیق سه میزان بذر ۱۰، ۱۵ و ۲۰ کیلوگرم در هکتار و چهار فاصله کاشت ۴۰، ۶۰، ۷۵ و ۱۰۰ سانتیمتر در قالب طرح آماری کرتهاخ خرد شده با چهار تکرار به مدت ۴ سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تیمار فاصله کاشت ۴۰ سانتیمتر و میزان بذر ۱۵ کیلوگرم در هکتار با تولید متوسط ۵۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد علوفه را داشت و اختلاف آن با سایر تیمارها معنی دار بود. عملکرد تیمارها نیز در سالهای مختلف آزمایش متفاوت بود.

واژه های کلیدی: فاصله کاشت، میزان بذر، عملکرد علوفه، پوترویوم، چالکی گرگان.

تاریخ پذیرش: ۸۴/۱/۱۵

تاریخ دریافت: ۸۳/۱۰/۱۵

^۱ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

مقدمه:

پوترویوم (*Sanguisorba minor Scop.*) گیاهی دائمی و همیشه سبز از خانواده گل سرخیان (Rosacea) است و تاریخی ۲۰۰۰ ساله دارد و در قسمتهای زیادی از کوههای امریکای شمالی و اروپا و نیز کوههای خاور میانه در خاکهای شنی تا رسی و بیشتر در خاکهای با بافت سیلت - لوم دیده می‌شود(۸). در شمال و غرب ایران از ارتفاع ۳۵۰ تا ۲۷۰۰ متر از سطح دریا که بارندگی بیشتر از ۳۰۰ میلیمتر در سال دارد به مقدار زیاد مشاهده می‌شود(۱و۲). مقاومت زیادی به سرما و خشکی داشته و می‌تواند تا حدودی شوری (۱۶-۸ میلی موز بر سانتیمتر)(۷)، اسیدیته(۸) و حاصلخیزی کم خاک را تحمل کند. این گونه خاکهای با زهکشی ضعیف و مناطق سیلگیر و با آب زیر زمینی بالا را تحمل نمی‌کند. معمولاً در مناطق آفتابگیر از رشد خوبی بر خوردار بوده و به ندرت در مناطق سایه دار رشد می‌کند. این گیاه حاوی مقدار زیادی ویتامین C است و در اروپا از آن به عنوان سبزی خوراکی و سالاد استفاده می‌شود. برای انواع دام و به خصوص گوسفند و نیز حیات وحش در تمام طول سال از ارزش زیادی بر خوردار است. این گیاه را می‌توان دو و یا سه بار در سال برداشت نمود، لیکن چرای مستقیم آن از فواید بیشتری بر خوردار است. گونه مناسبی برای کشت مخلوط با لگومها و گراسهای پایا است، لیکن کاشت آن به صورت خالص نیز متداول است. در این حالت مقدار ۱۲ کیلوگرم بذر در هکتار در روی خطوطی با فاصله ۴۵ تا ۶۰ سانتیمتر توصیه شده است(۶).. نسبت به چرا نیمه مقاوم بوده و در کشت مخلوط قدرت رقابت قابل توجهی دارد(۸).

بررسیهای انجام شده در ایستگاه پاسند و در خاک شنی - رسی و بارندگی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتر نشان داد که علوفه آن حدود ۳۶۶۳ کیلوگرم در هکتار بوده است(۳). نتایج بررسی دیگری در همین ایستگاه نشان داد که رقم کابلی این گونه حدود ۴۸۴۷ کیلو

گرم در هکتار علوفه تولید کرده است (۵). کشت این گونه در منطقه کلاله گبد با بارندگی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر و خاک لومی - رسی نشان داد که سازگاری خوبی در منطقه مذکور داشته است و از تولید قابل توجهی برخوردار است (۶). بررسیهای انجام شده در زلاندنو نشان داد که از این گونه می‌توان برای تولید علوفه (۴,۵) تن در هکتار و حفاظت خاک استفاده نمود (۷).

کشت این گونه در منطقه گرگان نشان داد که از عملکرد علوفه قابل توجهی برخوردار است. بنابراین ضرورت داشت تا در مورد بهزروعی آن بررسیهایی انجام شود. هدف از این بررسی، تعیین مقدار بذر و فاصله کاشت مناسب گونه مذکور جهت تولید حد اکثر علوفه در شرایط چالکی گرگان بود.

مواد و روشها:

- موقعیت و محل اجرای آزمایش

این بررسی در ایستگاه چالکی با خاک عمیق و حاصلخیز و بافت لومی-رسی واقع در ۱۰ کیلومتری غرب گرگان و بارندگی ۴۵۰ تا ۶۵۰ میلیمتر در سال (جدول شماره ۱) به اجراء در آمد.

جدول شماره (۱): میانگین بارندگی (میلیمتر) ایستگاه چالکی در سال های بررسی

سال	۱	۲	۳	۴	میانگین ۴ سال	بارندگی
۵۶۳,۷۵	۵۵۰	۶۵۰	۶۰۵	۵۶۳,۷۵		

- تیمارها و طرح آماری

در این بررسی چهار فاصله کاشت ۴۰ و ۶۰، ۶۵ و ۱۰۰ سانتیمتر به عنوان تیمارهای اصلی وسه میزان بذر ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان تیمارهای فرعی در قالب طرح آماری کرتها خرد شده با چهار تکرار به اجرا درآمد. محاسبات آماری در مورد میانگین وزن خشک علوفه تولیدی تیمارها در هر سال و نیز درباره میانگین چهار ساله آنها انجام و سر انجام میانگین ها با روش دانکن و در سطح ۱٪/با هم مقایسه شد.

نتایج

بررسی فنولوژیکی گیاه در سالهای مختلف نشان داد که رشد رویشی این گیاه در تمام طول سال ادامه داشته و از اواسط مهر ماه تا اواسط مرداد ماه بارز تر از سایر مواقع می باشد. با این وجود در اواسط اردیبهشت بیش از ۸۰ درصد بوته ها به گل رفته و تشکیل بذر آغاز می گردد. میانگین تولید علوفه حاصل از دو چین (چین اول در اواسط اردیبهشت و چین دوم در اوایل تیر) این گیاه در هر سال در تیمارهای مورد بررسی به قرار جدول شماره ۲ بود.

جدول شماره (۲): میانگین تولید علوفه (کیلوگرم در هکتار) تیمار ها در سالهای بررسی

	فاصله (سانتیمتر)														
	۱۰۰	۷۵	۶۰	۴۰		۱۰	۲۰	۱۵	۱۰	۲۰	۱۵	۱۰	۲۰	۱۵	۱۰
	بذر(کیلوگرم در هکتار)														
سال ۱	۳۴۰	۳۱۰	۲۹۲	۴۱۵	۳۹۲	۳۳۷	۵۲۵	۵۰۵	۴۱۵	۵۴۷	۵۱۷	۴۴۵			
	۰	۰	۵	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۵	۰			
سال ۲	۳۸۸	۳۹۶	۴۰۱	۴۷۹	۴۸۵	۴۶۴	۵۱۴	۵۰۱	۴۸۶	۵۰۹	۵۴۴	۵۴۷			
	۲	۰	۴	۲	۵	۷	۱	۵	۳	۳	۲	۴			
سال ۳	۳۸۷	۴۴۷	۴۴۶	۳۹۲	۴۱۸	۴۲۳	۴۲۸	۴۸۴	۵۰۴	۳۵۸	۴۸۶	۴۸۵			
	۵	۳	۶	۳	۸	۳	۲	۹	۱	۷	۲	۵			
سال ۴	۴۲۰	۴۲۰	۴۳۹	۵۲۶	۵۰۵	۴۸۵	۴۱۹	۴۹۹	۴۵۴	۳۷۹	۵۵۲	۵۰۴			
	۵	۶	۱	۹	۱	۷	۱	۲	۶	۸	۷	۴			
میانگین کل	۲۸۴	۳۹۳	۴۱۹	۴۵۵	۴۵۰	۴۲۷	۴۷۱	۴۹۷	۴۶۵	۴۴۸	۵۲۵	۴۹۵			
	۰	۵	۹	۸	۵	۸	۶	۶	۰	۸	۱	۶			

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مقادیر مختلف بذر و نیز فواصل مختلف کاشت در تولید علوفه گیاه پوتربیوم اثرات متفاوتی داشته است . نتایج تجزیه و تحلیل های آماری در سطح ۱٪ و ۵٪ حاکی از آن است که تیمار فاصله ۴۰ سانتیمتر و مقداربذر ۲۰ کیلوگرم با عملکرد ۵۴۷۵ کیلوگرم در هکتار در سال اول ، تیمار فاصله ۴۰ سانتیمتر و بذر ۱۰ کیلوگرم با عملکرد ۵۴۷۴ کیلوگرم در هکتار در سال دوم ، تیمار فاصله کاشت ۴۰ سانتیمتر و مقداربذر ۱۵ کیلوگرم با عملکرد ۴۸۶۲ کیلوگرم در هکتار در سال سوم و بالاخره تیمار فاصله ۴۰ سانتیمتر و مقداربذر ۱۵ کیلوگرم با عملکرد ۵۵۲۷ کیلوگرم در هکتار در سال چهارم نسبت به سایر تیمارها از عملکرد بیشتری بر خوردار بوده اند. مقایسه میانگین چهار ساله تیمارهای آزمایش نیز نشان داد که تیمار فاصله ۴۰ سانتیمتر و مقداربذر ۱۵ کیلوگرم با عملکرد ۵۲۵۱ کیلوگرم در هکتار بهترین تیمار آزمایشی بودو تیمارهای فاصله ۶۰ سانتیمتر و مقدار بذر ۱۵

کیلوگرم با عملکرد ۴۹۷۶ کیلوگرم در هکتار و فاصله ۴۰ سانتیمتر و مقدار بذر ۱۰ کیلوگرم با عملکرد ۴۹۵۶ کیلوگرم در هکتار در رتبه های بعدی قرار گرفته اند) جدول (۳).

جدول شماره (۳) : تجزیه و تحلیل جدول واریانس میانگین چهار ساله تیمارهای آزمایشی

منبع تغییرات	درجه آزادی	جمع مربعات	F
تکرار (سال)	۳	۹۰۲۱۸۹۹۹,۲	۲۶,۶۵
تکراروسال	۱۲	۱۲۵۹۲۱۲,۶	۰,۹۳
فاصله کاشت	۳	۲۸۱۴۱۶۲۸,۵	۸۳,۰۱
اثر سال و فاصله کشت	۹	۱۸۷۶۸۷۶۷,۵	۱۸,۴۸
اشتباه	۳۶	۴۰۶۱۹۷۸,۱	-
میزان بذر	۲	۲۴۹۴۲۲۵,۶	۲۱,۶۴
اثر سال و میزان بذر	۶	۱۱۱۴۱۲۶۰,۴	۳۲,۲۲
اثر متقابل فاصله کشت و میزان بذر	۶	۳۶۳۷۰۹۴,۷	۱۰,۵۲
اثر متقابل فاصله کشت و میزان بذر و سال	۱۸	۴۸۸۹۵۵۸	۴,۷۱
اشتباه	۹۶	۵۵۳۱۶۷۰,۵	-
کل	۱۹۱	۸۸۹۴۷۲۹۵,۵	-

بحث و نتیجه گیری:

بررسی آماری تیمارهای بذر نشان داد که تیمار فاصله ۴۰ سانتیمتر و بذر ۲۰ کیلو در هکتار با عملکرد ۵۴۷۵ کیلوگرم در هکتار در سال اول ، تیمار فاصله ۴۰ سانتیمتر و بذر ۱۰ کیلو با عملکرد ۵۴۷۴ کیلوگرم در هکتار در سال دوم ، تیمار فاصله ۴۰ سانتیمتر و بذر ۱۵ با عملکرد ۴۸۶۲ کیلو در هکتار در سال سوم و تیمار فاصله ۴۰ سانتیمتر و بذر ۱۵ با عملکرد ۵۵۲۷ کیلو در هکتار در سال چهارم بیشترین عملکرد بذر را داشته اند .

مقایسه میانگین تیمارها طی ۴ سال آزمایش نشان داده است که تیمار فاصله ۰ سانتیمتر و مقداربذر ۱۵ کیلوگرم با عملکرد ۵۲۵۱ کیلوگرم در هکتار بهترین تیمار آزمایشی بودو تیمارهای فاصله ۶۰ سانتیمتر و مقداربذر ۱۵ کیلوگرم با عملکرد ۴۹۷۶ کیلوگرم در هکتار و فاصله ۴۰ سانتیمتر و مقداربذر ۱۰ کیلوگرم با عملکرد ۴۹۵۶ کیلوگرم در هکتار در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در رابطه با اثر فاصله کشت و میزان بذر بر عملکرد علوفه راینسون و همکاران (۶) گزارش داده اند که مقداربذر ۱۲ کیلو گرم در هکتار و فاصله کاشت ۴۵ تا ۶۰ سانتیمتر بیشترین تولید علوفه را داشته است. این نتیجه با نتایج بدست آمده در این تحقیق به مقدار زیادی همسو است. به طوری که مقداربذر ۱۵ کیلو گرم در هکتار و فاصله کاشت ۴۰ سانتیمتر در تحقیق حاضر بیشترین عملکرد علوفه را داشته است. پور نجف و همکاران (۳) گزارش کرده اند که کشت این گونه در ایستگاه پاسند با خاک شنی-رسی و بارندگی ۶۰۰ میلیمتر حدود ۴۸۴۷ کیلوگرم در هکتار تولید داشته است. مقایسه این تولید با تولید منطقه تحقیق نشان دهنده تولید بیشتر در چالکی است و این امر را می توان به حاصل خیزی بیشتر خاک چالکی نسبت داد. سندگل و همکاران (۵) در بررسی مشابه در منطقه کلاله گند بخاک لومی-رسی و بارندگی ۵۰۰ میلیمتر به نتایج مشابه اشاره نموده اند.

بطور کلی می توان گفت که تولید علوفه نسبتاً زیاد با اعمال فاصله کاشت کم و مقداربذر متوسط ناشی از بهره گیری بهتر گیاه از شرایط محیطی جهت تولید اندام های رویشی و طولانی تر شدن دوره فتوسنتز گیاه در خلال دوره زایشی و نیز بهره گیری بیشتر از رطوبت خاک در عمق ریشه می باشد. افزایش مقدار بارندگی در سالهای دوم و سوم آزمایش نیز موید این نظر است که انبوهی زیادتر گیاه در عرصه و در تیمارهای با فاصله کم شرایط بهتری را برای رشد رویشی فراهم نموده است.

منابع مورد استفاده:

- ۱- پابو، هانری ، ۱۳۴۵ . اصلاح و توسعه مراعع ایران از طریق مطالعات بتانیکی و اکولوژیکی ترجمه گودرز شیدایی. انتشارات سازمان جنگلها و مراعع.
- ۲- پورنجمف ، سعید و ابوالحسن سلامی ، ۱۳۷۷ . کشت و کار گیاه علوفه ای توت رویاه در مازندران . مجموعه مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. انتشارات سازمان تات.
- ۳- پور نجف، سعید ، حسن شبایی و سید رضی رسولی ، ۱۳۷۹ . مقایسه میزان تولید علوفه ارقام مختلف پوتربیوم در شرایط دیم زاغمرز. گزارش فنی طرح تحقیقاتی. در دست انتشار.
- ۴- پیمانی فرد، بهرام و بهروز ملک پور ، ۱۳۶۰ . معرفی گیاهان مهم مرتعی و راهنمای کشت آنها. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراعع. نشریه ۲۴.
- ۵- سندگل ، عباسعلی و مهدی کلاته عربی ، ۱۳۷۰ . بررسی سازگاری نباتات مرتعی در کلاله گنبد. انتشارت موسسه تحقیقات جنگل ها و مراعع. نشریه ۶۹ ..
- 6 - United States Salinity Laboratory Staff , 1954. Diagonosis and improvement of saline and alkali soils. Handbook 60. United States Department of Agriculture.160pp.
- 7-C. H. Wasser.1982. Ecology and culture selected species useful in revegetating disturbed lands in the west U.S.A. Fish and wildlife service.
- 8-J.N. Davis. 1988. Seedling established biology and paterns of interspecific association ammong establishment of seeded and non seeded species on a chained juniper pinyon woodland in central Utah. Brigham young University