

## بررسی اثر تنش شوری بر رشد رویشی توده‌ها و ارقام یونجه

احمد رحمانی<sup>۱</sup> و شاپور حاج رسولیها<sup>۲</sup>

### چکیده

در این مطالعه مقاومت به شوری توده‌های یونجه بمی، یزدی، رهنانی، همدانی، قره‌یونجه و ارقام رنجرو و کریساری مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور این توده‌ها و ارقام در محلول غذایی Jonson شور شده با پتانسیل -۰/۰۷، -۰/۱۷ و -۰/۳۷ و -۰/۵۷ مگا پاسکال در گلخانه کشت داده شده و زمانی که حدود ۱۰٪ گیاهان به مرحله گلدهی رسیدند، عمل برداشت انجام گرفت.

تنش شوری باعث کاهش ارتفاع گیاه، وزن خشک قسمت هوایی و ریشه، وزن خشک و سطح برگ و طول ریشه گردید. در صورتی که درصد برگ در اثر شوری افزایش داشته است. توده‌های یزدی، رهنانی و بمی نسبت به سایر توده‌ها و ارقام عملکرد بالاتری را داشتند و رقم کریساری بیشترین درصد برگ را دارا بود. توده‌های همدانی و قره‌یونجه از نظر تمام صفات مورد بررسی به استثنای ارتفاع گیاه کمترین رتبه را داشته‌اند. تجزیه شیمیایی گیاهان نشان داد که تحت تیمار کلرور سدیم عناصر سدیم و کلر در قسمت هوایی و ریشه افزایش داشته است، ولی مقدار افزایش در توده‌ها و ارقام مختلف متفاوت بوده است.

**واژه‌های کلیدی:** تنش شوری، رشد رویشی، بمی، یزدی و...کریساری.

- 
- ۱- عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
  - ۲- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

## مقدمه

یونجه (*Medicago sativa*.L) یکی از بهترین نباتات علوفه‌ای است که از نظر عملکرد زیاد در واحد سطح، مواد غذایی قابل هضم، سازگاری وسیع به شرایط آب و هوایی، مواد مغذی فراوان، درصد بالای پروتئین و دارا بودن انواع ویتامینها اهمیت زیادی دارد.

میان گیاهان تیره بقولات تحمل به شوری طیف وسیعی دارد. Peter و همکارانش (۱۹۸۱) گزارش کردند که گونه‌های درختچه‌ای از جنس *Prosopis* مانند *P. tamarago*، *P. Palida* و *P. articulata* با کاهش محصول، ۱۸۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلرید سدیم را تحمل کردند و در شوری ۳۶۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر (که از آب دریا شورتر است) به مقدار کمی رشد نمودند و این اولین گونه از بقولات شناخته شده‌ای است که در شوری آب دریا می‌تواند رشد کند. در حالی که بقولات یکساله مانند *Phseolus vulgaris* و *Pisum sativum* مقدار ۳۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلرید سدیم را هم به ندرت تحمل می‌کنند.

میان واریته‌های مختلف یونجه از نظر میزان تحمل به شوری تنوع زیادی وجود دارد، ولی به طور کلی در گروه گیاهان به نسبت متحمل قرار می‌گیرند (کلbasی ۱۳۵۹ و همکاران ۱۹۷۹، ۱۹۸۷ Migamito و Waissman و Ston ۱۹۸۷) و ESP بین ۴۰ تا ۶۰ درصد را تحمل می‌کند. اکثر گزارشها حاکی از این است که مرحله استقرار این گیاه نسبت به مراحل دیگر حساسیت بیشتری به شوری دارد (کلbasی ۱۳۵۹، Lowell ۱۹۷۴ و همکاران ۱۹۸۴ Nobel و همکاران ۱۹۸۴ Wageenet).

نمک از طریق افزایش فشار اسمزی محلول خاک، سمیت یونها و بهم زدن تعادل یونها یا کمبود تغذیه‌ای موجب آسیب رسیدن به گیاه می‌شود (کلbasی ۱۳۵۹، Hajj رسولیها ۱۳۶۴ Joshi، ۱۹۸۴ Levit، ۱۹۸۰ Mass و Hoffman ۱۹۷۷ و همکاران ۱۹۸۵ Gorham و Redman ۱۹۸۴). صدمه اولیه نمک به

گیاه ابتدا بر اثر اثرات سمی یونها است، تأثیر یونها یا به طور مستقیم روی غشاء سیتوپلاسمی است، یا اینکه پس از عبور از آن به پروتوبلاست آسیب می‌رساند (Levit, ۱۹۸۰).

شوری ممکن است از طریق بهم زدن تعادل یونی و اثر بر تغذیه، رشد گیاه را محدود نماید (Joshi, ۱۹۸۴؛ Levit, ۱۹۸۰؛ Lowell, ۱۹۶۴؛ Mass, ۱۹۷۷؛ Hoffman و Kirk, ۱۹۸۲). برای مثال گزارشایی مبنی بر کمبود کلسیم در حضور مقدار زیادی سولفات در بعضی گیاهان وجود دارد (Christian, ۱۹۷۷)، همچنین در بسیاری از مطالعات انجام شده در حضور سدیم، کاهش جذب پتابسیم در غلظتهاي بالاي سدیم و وجود خاصیت آنتاگونیسمی بین سدیم و پتابسیم دیده شده است (Joshi, ۱۹۸۴ و Kirk و Mengel, ۱۹۸۲).

گیاهان از سازوکارهای مختلفی مانند ممانعت (Exclusion)، دفع (Excretion) و تنظیم اسمزی (Osmoregulation) برای مقاومت به شوری ریق سازی (Dilution) استفاده می‌کنند (Levite, ۱۹۸۰؛ Nobel و همکاران, ۱۹۸۴). گزارش کردند که جذب کلر و سدیم در قسمت هرایی گونه‌های مقاوم یونجه نسبت به گونه‌های حساس به کلرید سدیم کمتر بوده است، در نتیجه تحمل به شوری در یونجه را به سازوکار ممانعت که توسط سایر گلیکوفیتیها هم عمل می‌شود نسبت داده‌اند. گزارشاتی مبنی بر استفاده بعضی از گلیکوفیتیها مانند ذرت و سورگم از سازوکار دفع وجود دارد (Levite, ۱۹۸۰). نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که تنظیم اسمزی نیز یکی از سازوکارهایی است که در یونجه سبب افزایش تحمل به شوری می‌شود (Levite, ۱۹۸۰).

هدف از انجام این تحقیق مقایسه ارقام و توده‌های یونجه از نظر تحمل به شوری و بررسی صفات مختلف یونجه در سطوح مختلف شوری بوده است.

## مواد و روشها

در این آزمایش از پنج توده یونجه داخلی بمی، یزدی، رهانی، همدانی، قره‌یونجه و دو رقم خارجی رنجر و کریساری استفاده شده است. برای کنترل دقیق مقدار شوری از روش کشت در محلول غذایی شور شده با غلظتها م مختلف کلرید سدیم استفاده شد. بدین منظور ابتدا بذرهای گیاهان انتخاب شده با محلول ۱۰ درصد هیپوکلرید سدیم و قارچ‌کش بنومیل ۲ در هزار ضد عفونی شدند. بعد هر توده یا رقم به طور جداگانه در ظرفهای حاوی ماسه شسته شده کشت گردید. ماسه‌ها پیش‌تر چندین بار با آب شسته شده و ۳ روز در حرارت ۱۵° درجه سانتیگراد قرار گرفتند. بذرهای کشت شده با آب مقطر آبیاری گردیدند تا به مرحله یک برگی رسیدند. سپس تعداد ۳ گیاهچه سالم از هر توده یا رقم انتخاب و در سطلهای ۲/۲ لیتری حاوی محلول غذایی Jonson که توسط نمک کلرور سدیم برای ایجاد پتانسیل مورد نظر -۰/۱۷<sup>-۰/۳۷</sup> و -۰/۰۷<sup>-۰/۰۷</sup> مگاپاسکال شور شده بود منتقل شدند (محلول غذایی جانسون با توان بالقوه -۰/۰۷<sup>-۰/۰۷</sup> مگا پاسکال به عنوان شاهد در نظر گرفته شد). محلول هر کدام از ظرفها توسط پمپ هوا بهم زده می‌شد.

ارتفاع گیاهان هر دو هفته یکبار اندازه‌گیری می‌شد. همچنین خصوصیات ظاهری گیاهان، تعداد ساقه در هر بوته و هدایت الکتریکی محلول غذایی در طول آزمایش اندازه‌گیری و یادداشت می‌گردید. اندازه‌گیری تنش آب گیاهان در هفته پنجم توسط دستگاه بمب فشاری (Pressure Bomb) انجام گرفت. طول ساقه و ریشه، وزن خشک قسمت هوایی و ریشه و سطح برگ وقتی که ۱۰ درصد گیاهان به گل رفتند اندازه‌گیری شد.

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوكهای کامل تصادفی در ۳ تکرار پیاده و تجزیه و تحلیل شد. برای بررسی وضعیت تجمع عناصر غذایی، قسمت هوایی و ریشه خشک شده گیاهان مورد تجزیه قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری کلر از روش Aderano

و همکاران (۱۹۷۳) و برای اندازه‌گیری سدیم از فلیم فتومنتر با فیلتر مخصوص سدیم استفاده شد.

## نتایج

مقایسه میانگین ارتفاع توده‌ها و ارقام در پتانسیل مختلف شوری (جدول شماره ۱) نشان می‌دهد که در توان بالقوه ۰/۰۷- مگاپاسکال توده همدانی بیشترین ارتفاع را نسبت به سایر توده‌ها و ارقام داشته و در توان بالقوه ۰/۰۵۷- مگاپاسکال میزان کاهش ارتفاع آن ۵۳/۹ درصد بوده که زیادتر از سایر ارقام و توده‌ها بوده است.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر توده‌ها و ارقام و همچنین اثر شوری بر وزن خشک قسمت هوایی در سطح احتمال ۱٪ و اثر متقابل واریته و شوری در سطح احتمال ۰/۵٪ معنی‌دار می‌باشد. با افزایش شوری، وزن خشک قسمت هوایی، وزن خشک برگ و وزن خشک ریشه کاهش پیدا کرده و میزان کاهش در پتانسیل مختلف با یکدیگر در سطح ۰/۱٪ تفاوت معنی‌داری دارند. کاهش سطح برگ در پتانسیل ۰/۰۵۷- و ۰/۰۳۷- نسبت به شاهد معنی‌دار بود (جدول شماره ۲). توده یزدی با اینکه بیشترین عملکرد را در مقایسه با سایر توده‌ها و ارقام دارا است، ولی درصد کاهش وزن خشک قسمت هوایی آن در توان بالقوه ۰/۰۵۷- مگاپاسکال نسبت به شاهد از تمام توده‌ها و ارقام بیشتر است (۸۷/۵ درصد) و توده بمی در پتانسیل ۰/۰۷۵- مگاپاسکال نسبت به ۰/۰۷ مگاپاسکال کمترین کاهش وزن را داشته است.

شوری سبب افزایش درصد برگ یونجه می‌شود. تفاوت میان درصد برگ در تمام سطوح شوری از نظر آماری معنی دار بوده است (جدول شماره ۲). در میان ارقام و توده‌های مورد استفاده رقم کریساری بیشترین درصد برگ و توده همدانی کمترین درصد برگ را داشته‌اند (جدول شماره ۳).

شوری باعث کاهش وزن خشک ریشه یونجه شده است. مقایسه میانگین وزن ریشه توده‌ها و ارقام نشان می‌دهد که توده یزدی بیشترین وزن ریشه و توده همدانی کمترین وزن ریشه را داشته‌اند (جدول شماره ۳).

توده یزدی با اینکه بیشترین عملکرد را در مقایسه با سایر توده‌ها و ارقام دارا است، ولی درصد کاهش وزن خشک قسمت هوایی آن در پتانسیل ۰/۵۷ - مگاپاسکال نسبت به شاهد از تمام توده‌ها و ارقام بیشتر است (۸۷/۵ درصد) و توده بمی در پتانسیل ۰/۵۷ - مگاپاسکال نسبت به ۰/۰۷ - مگاپاسکال کمترین کاهش وزن خشک و سطح برگ را داشته است (جدول شماره ۴ و ۵). شوری سبب کاهش پتانسیل آب در تمام توده‌ها و ارقام شده است. توده بمی کمترین کاهش (۲۴/۱) و یزدی بیشترین کاهش را در پتانسیل ۰/۵۷ - مگاپاسکال نسبت به شاهد داشته‌اند (جدول شماره ۶).

تجزیه شیمیایی گیاهان نشان داد که تحت تیمار کلروسدیم، عناصر سدیم و کلر در قسمت هوایی و ریشه تمام توده‌ها و ارقام افزایش داشته است (نمودارهای شماره ۱ تا ۴). مقدار سدیم و کلر قسمت هوایی توده رهنانی در سطوح بالای شوری از سایر توده‌ها و ارقام بیشتر است. توده بمی کمترین مقدار کلر را در قسمت هوایی و ریشه خود داشته است.

## بحث

از نظر ارتفاع گیاهان توده همدانی با وجود آنکه در توان بالقوه ۰/۰۷ - مگاپاسکال بیشترین ارتفاع را داشته به میزان بیشتری تحت تأثیر شوری قرار گرفته است و در اثر شوری بیشترین کاهش ارتفاع را نشان داده است. این نتایج با تحقیقات Brown و Tanner (۱۹۸۳) که اثر خشکی را بر ارتفاع گیاهان بررسی کرده‌اند مطابقت دارد. آنها اظهار داشتند که هر چه ارتفاع گیاه بیشتر باشد میزان کاهش ارتفاع آن در اثر خشکی

بیشتر خواهد بود. کاهش ارتفاع یونجه در اثر شوری توسط محققان دیگر نیز گزارش شده است (Brown و Hayward ۱۹۵۶ و Hmkaran ۱۹۸۴).

کاهش رشد و واکنش متفاوت توده‌ها و ارقام با یکدیگر نتیجه مستقیم پتانسیل فیزیولوژیکی متفاوتی است که گیاهان استفاده می‌کنند. عملکرد زیاد توده یزدی در شرایط غیرشور (شاهد) نشان می‌دهد که این توده از توان بالقوه تولید بالای نسبت به سایر توده‌ها و ارقام برخوردار بوده است. در سطوح بالای شوری (توان بالقوه ۰/۳۷ و ۰/۵۷- مگا پاسکال) توده‌های بمی و رهنانی از نظر وزن خشک قسمت هوایی نسبت به توده یزدی برتری دارند. توده بمی از نظر سطح برگ در سطوح بالای شوری نیز برتری خود را حفظ کرده و کمترین درصد کاهش سطح برگ را دارا بوده است. این برتری نشان می‌دهد که توده بمی در شرایط شور بهتر از سایر توده‌ها و ارقام خود را با شرایط شور منطبق می‌نماید. کاهش کمتر وزن خشک ریشه این گیاه در شرایط شور یکی از ساز و کارهای مقاومت به شوری این توده می‌تواند باشد که به آن امکان می‌دهد که از آب موجود در محیط ریشه بهتر استفاده کند. مقایسه توان بالقوه آب توده بمی با سایر توده‌ها و ارقام در سطوح بالای شوری (جدول شماره ۴) مؤید این مطلب است که این گیاه نسبت به سایر توده‌ها و ارقام توانسته است در شرایط شور، توان بالقوه آب خود را بالا نگاه دارد و اثر سوء ناشی از غلظت زیاد نمک را کاهش دهد که علت آن احتمالاً زیاد بودن ریشه‌های این توده و جذب آب بیشتر در شرایط شور بوده است.

جلوگیری از ورود یونها یکی از ساز و کارهای اجتناب از شوری است. پایین بودن غلظت کلر و سدیم در قسمت هوایی توده بمی گواه این است که احتمالاً این توده از ساز و کار ممانعت استفاده کرده و غلظت عناصر را پایین نگاه داشته است. Nobel و همکارانش (۱۹۸۴) نیز تحمل به شوری یونجه را به توانایی آنها در جلوگیری از ورود یونهای کلر و سدیم به قسمت هوایی گیاه نسبت داده‌اند و گزارش نمودند که گیاهان

متحمل به شوری یونجه نسبت به گیاهان حساس‌تر مقدار کمتری کلر و سدیم در قسمت هوایی خود داشته‌اند. این ساز و کار در گیاهان دیگر نیز گزارش شده است (Nobel و همکاران ۱۹۸۴). به نظر می‌رسد که توده رهنانی از ساز و کار دیگری برای تحمل شوری استفاده کرده است. زیاد بودن درصد کلر و سدیم در قسمت هوایی این توده بیانگر این است که ساز و کار جلوگیری از ورود یون در این توده کارآیی ندارد و بالا بودن وزن مخصوص برگ این توده نشان می‌دهد که احتمالاً این توده از طریق تنظیم اسمزی شوری را تحمل می‌کند. گزارش‌هایی مبنی بر احتمال وجود ساز و کار تنظیم اسمزی در یونجه وجود دارد (Nobel و همکاران ۱۹۸۴).


دو توده همدانی و قره‌یونجه از نظر وزن خشک قسمت هوایی، وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه و سطح برگ نسبت به سایر توده‌ها حداقل رتبه را دارند. بالا بودن نسبت تاج به ریشه در دو توده قره‌یونجه و همدانی تحت تیمار شوری (جدول شماره ۳) نشان‌دهنده رشد کم ریشه این توده‌ها در مقایسه با سایر توده‌ها و ارقام می‌باشد. رشد کم ریشه علاوه بر اینکه ممکن است در انتقال آب و مواد غذایی اثر بگذارد، از طریق تأثیر بر توازن هورمونها، رشد قسمت هوایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین به علت اینکه ریشه منبع تخلیه مواد فتوستتری است، رشد کم آن به منزله عدم توانایی این اندام برای مصرف مواد فتوستتری بوده که منجر به ایجاد سیستم باز دارنده پس‌خورد (Feed back inhibition) می‌شود و فتوستتر کاهش می‌یابد، در نتیجه رشد قسمت هوایی نیز کاهش خواهد داشت. Balasubramanian و همکاران (۱۹۷۶) نیز عدم رشد مناسب برخی از گیاهان در محیط شور را به حسا سیت ریشه این گیاهان به شوری نسبت داده‌اند.

رقم کریساری در مقایسه با سایر توده‌ها از درصد برگ بالاتری برخوردار بود که بیانگر رشد بیشتر سطح فتوستتر کننده این گیاه نسبت به سایر اندامها است. این توده با


در صد برگ زیاد می‌تواند از کیفیت علوفه بهتری نسبت به سایر توده‌ها و ارقام برخوردار باشد.

مقایسه توده‌ها و ارقام از نظر وزن مخصوص برگ نشان می‌دهد که رقم رنجر نازکترین برگ را داشته که این صفت می‌تواند ساز و کار خوبی برای جذب انرژی خورشید و بالا بردن بازده فتوستتر باشد. اثر شوری بر وزن مخصوص و سطح برگ گیاهان نشان می‌دهد گه غلظت زیاد نمک سبب افزایش معنی‌دار وزن مخصوص برگ و کاهش معنی‌دار سطح برگ شده است. سطح برگ و وزن مخصوص برگ رابطه‌ای مستقیم با رشد برگ دارد و کاهش سطح برگ و افزایش وزن مخصوص در پتانسیل کم (شوری زیاد) نشان داد که غلظتهای بالای نمک رشد را تحت تأثیر قرار داده است.


بررسی وزن خشک قسمت هوایی، وزن برگ، سطح برگ و طول گیاه در پتانسیل مختلف شوری نشان می‌دهد که سطح برگ و طول گیاه کمتر از دو صفت دیگر تحت تأثیر شوری قرار گرفته است. اگر وزن خشک قسمت هوایی را معیاری از فتوستتر و طول گیاه و سطح برگ را معیاری از رشد بدانیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که در گیاه یونجه، شوری، فتوستتر را بیشتر از رشد تحت تأثیر قرار می‌دهد.




نمودار شماره ۱- درصد سدیم قسمت هواپی ارقام و توده‌های یونجه در توان بالقوه مختلف نمک



نمودار شماره ۲- درصد سدیم ریشه ارقام و توده‌های یونجه در پتانسیل مختلف نمک



نمودار شماره ۳- درصد کلر قسمت هواپی ارقام و توده‌های یونجه در پتانسیل مختلف نمک



نمودار شماره ۴- درصد کلر ریشه ارقام و توده‌های یونجه در پتانسیل مختلف نمک

جدول شماره (۱): مقایسه میانگین \* ارتفاع گیاهان (ساتیمتر) در زمان برداشت (عهته پنجم) و درصد کاهش ارتفاع نسبت به شاهد

(داخل براتر)

در توانایی بالقوه مختلف سوری

توان بالقوه اسراری  
(مگا پاسکال)

رنجر	هدامی	بزدی	کربساری	قره یونجه	بسی	رهنگی
wrrabc	۸۷۵۰۹	۷۰۳۹abcd	۷۰۲۱bcde	۸۷۵۰ab	۷۷۸۴abcd	۷۷۸۴abcd

۶۰/۵۷defg	۷۴/۰۷abcd	۷۳/۳۷bcd	۷۳/۲۷abcd	۸۷/۱۰abc	۷۸/۱۱abcdef	۷۰/۰۷abcd
(۲۱/۷۹)	(۱۳/۸۰)	(۲۷۸۳)	(۰)	(۷۷۲)	(۷۵۱)	(۱/۵۲)

۰۰/۷۷ghij	۰۷/۰۱efgh	۰۵/۰۷fghi	۰۰/۰۹ghij	۰۷/۰۱efgh	۰۶/۰۷cdedf	۰۷/۱۱efgh
(۳۴/۴۷)	(۲۳/۲۹)	(۲۷۷۰)	(۳۷/۵۳)	(۳۰/۸۲)	(۹/۹۰)	(۲۷۸۲)

۳۹/۲۷	۳۹/۰۸ij	۳۰/۷۷j	۳۸/۰۹j	۳۷/۰۵ghij	۳۴/۰۰hij	۳۱/۱۱ij	-۰/۵۷
(۴۹/۲۸)	(۵۳/۹۱)	(۴۵/۹۲)	(۴۴/۴۷)	(۴۷/۶۰)	(۴۱/۰۰)	(۴۷۳۸)	

\* میانگینها توسط آزمون چند دامنه داکن در سطح استعمال (۱٪ مقلوبه شده‌اند).

جدول شماره (۲): مقایسه میانگین \* هفت خصوصیت ارقام و توده‌های یونجه در نوافهای بالقوه مختلف شوری

درصد برج	وزن مخصوص برج میلی گرم بر (ساتینتر مرغ)	طول ریشه (ساتینتر) میلی گرم بر	سطح برگ (ساتینتر مرغ)	وزن خشک ریشه (گرم)	وزن خشک برگ (گرم)	وزن خشک برگ (گرم)	وزن خشک هوایی (گرم)	توان بالقوه اسمنی (گیاپاسکال)
۵۷/۹۹d	۵/۳۷ab	۳۵/۸۷ab	۴۴/۴۳a	۰/۱۸a	۱/۹.a	۲/۹۷a	-/۱۰۷	
۵۱/۲۶c	۵/۳۲b	۳۹/۴۲a	۳۸۲/۷۷a	۰/۱۷b	۱/۷۲b	۲/۱۹b	-/۱۱۷	
۵۷/۳۷b	۵/۷۷ab	۳۷/۷۱a	۱۸۴/۱۰b	۰/۲۰c	۰/۸۰c	۱/۱۰b	-/۱۳۷	
۶۰/۱۷a	۵/۹۷a	۳۱/۹۰b	۸۳/۵۵c	۰/۱۷c	۰/۱۷c	۰/۶۷d	-/۱۰۷	

\* میانگین‌ها توسط آزمون چند دارمه دانکن در سطح احتمال ۱٪ مقایسه شدند. در هر سه قطب نثارت بین هر دو میانگین که دارای حرف مشترک هستند از نظر آماری معنی دار نیست.

جدول شماره (۳): مقایسه میانگین \* صفات مختلف ارقام و توده‌های یونیجنه در مرحله رشد رویشی تحت شرایط شوری

توده‌ها و ارقام	نوبت هوانی (گرم)	وزن خشک برگ (گرم)	وزن خشک برگ (گرم)	سطح برگ (ساتیتر مرتع)	طول ریشه (سانتیمتر)	وزن مخصوص برگ (صلی گرم بر سانتیمتر مرتع)	درصد برگ وزن ریشه / وزن تاج
بردی	۳۱۱۲	۰۰۸۲	۰۰۵۰	۳۰۷۶۴۰	۰۳۹۰	۰۴۴۷۷ab	۰۷/۱۰
بسی	۷۰۷ab	۰۰۷۲	۰۰۷۲	۳۰۷۶۲۹	۰۵۰۰	۰۴۴۷۷ab	۰۷/۵۷
رهنائی	۲۷۷ab	۰۰۷۳	۰۰۷۳	۳۰۷۶۳۹	۰۴۰۷	۰۴۴۷۷ab	۰۷/۷۰
کرساری	۲۷۴abc	۰۰۷۴	۰۰۷۴	۳۰۰۳۰۵a	۰۰۷۰	۰۵۰۹۷a	۰۵/۷۰
رنجر	۲۷۷abc	۰۰۷۵	۰۰۷۵	۳۰۰۳۰۵a	۰۰۷۰	۰۴۴۷۷ab	۰۷/۰
فره یونیجنه	۱۷۷cd	۰۰۷۶	۰۰۷۶	۱۹۷۷۶bc	۰۰۷۰	۰۵۸۴۰b	۰۵/۷۱
همدانی	۱۷۷cd	۰۰۷۶	۰۰۷۶	۱۸۱۷۷۲c	۰۰۷۰	۰۵۰۸۴b	۰۷/۰۸

\* میانگین‌ها توسط آزمون چند دامنه دانکن که دارای حرف مشترک هستند از نظر آماری معنی دار نیست.

جدول شماره (۴): مقایسه میانگین \* وزن خشک قسمت هوایی توده‌ها و ارقام مختلف یونجه (گرم) و درصد کاهش وزن نسبت به شاهد (داخل پر اتر) در توانایی بالقوه مختلف شوری

ارقام و توده‌ها						توان بالقوه	
رنگ	هدایت	بزدی	گرساری	فره بینجه	بسی	دنهانی	اسمرزی مکا پاسکال)
۲/۱۹b	۲/۲۰bcdē	۰/V/a	۳/V/bc	۲/۹/bcdē	۳/۹/bc	۴/۹/b	-۰/۰V
۲/۲۱bcdē (۳۳/۱۵)	۱/۸/ghij (۴۴/۳۱)	۱/V/b (۳V//۰)	۲/V/bcd (۲V/۲)	۲/V/veigh (۲۲/۲۹)	۲/V/cdef (۲۴/۲)	۴/V/b (۰/۲۴)	-۰/۱V
۱/jki (۷۷/۱۳)	۰/V/ijk (۷۵/۱۰)	۱/V/ghij (۶۷/۰۳)	۱/V/hijk (۶۱/۷۲)	۱/V/rijk (۶۲/۹۵)	۱/V/defg (۳۴/۵۳)	۱/V/fghi (۵۴/۸۹)	-۰/۳V
۰/V/jk (۸۴/۰۶)	۰/V/k (۸۷/۴۶)	۰/V/ijk (۸۸/۰۵)	۰/V/jk (۸۲/۴۸)	۰/V/k (۸۱/۹۵)	۰/V/ijk (۷۹/۷۹)	۰/V/ijk (۸۰/۹۱)	-۰/۵V

\* میانگین‌ها توسط آزمون چند دارمه دارکن در سطح احتمال ۵٪ مقایسه شده‌اند.

卷之三

در نوآنهاي بالقوه مختلف شوري

رتبه	مدادنی	خریدی	کرباساری	فره یونجه	بسی	رهنگان	ارقام و تعدادها	توان بالقوه اسمزی (مگا پاسکال)
۵۷/۱۰,abcd	۳۸/۱۰,bcde	۶۰/۲۱'a	۴۸۱/۸,ab	۳۰/۷۳۲defg	۴۲۷/۸,bcd	۴۴۲/۸,bcd	-۰/۰,۷	
۶۰,۷/۱,bcde	۱۸۸/۹,efghi	۵۰,۴/۷,avab	۴۱۹/۷,abc	۳۰,۷/۱,defg	۴۳۷/۷,۱,bcde	۴۳۰,۹,9bcd	-۰,۰/۱,۷	
(۱۰/۹۵)	(۵۲/۴۴)	(۱۷/۱۷)	(۲۰/۱)	(۰/۰,۰)	(۱۱/۴۷)	(۲۷/۸)		
۱۲۷/۲,ghi	۹۷/۰,8i	۳۶۰/۱۰,efgh	۱۶۰/۸,2ghi	۳۳۷/۷,۱,cded	۱۹۷/۷,efghi	۰۵/۶,۹	-۰,۷۷	
(۷۷/۳۲)	(۵۰/۲۰)	(۵۷/۸,۰)	(۶۷/۶۲)	(۰۹/۰,۶)	(۲۴/۴۴)			
۱۰۴/۱,2i	۵۱/۱,7i	۹۴/۷,۰,i	۸۹/۱,1i	۵۰/۱,7i	۴۷/۸,1,i	۴۲/۷,۰,i	-۰,۰/۰,۷	
(۷۷/۲۲)	(۸۷/۸,9)	(۸۴/۲,9)	(۸۱/۰,۰)	(۸۱/۹,۹)	(۷۷/۱,۰)	(۷۴/۰,۰)		

\* میانگین ها توسط آزمون پند دامنه دانکن در سطح احتمال ۵٪ مقایسه شده‌اند.

جدول شماره (۲): مقایسه میانگین \* توان بالقوه آب نودها و ارقام مختلف یونجه و درصد کاهش نسبت به شاهد (داخل پرائز)

در سطوح نسبت به شاهد (داخل پرائز) در سطوح مختلف شوری

ارقام نودها		ارقام نودها					توان بالقوه اسمرزی (مکانیسمکال)	
رنجرو	همدانی	بزدی	کویسواری	قره یونجه	بعی	رهنائی		
-۸/۳۳۲a	-۹/۳۳۲a	-۸/۷۷a	-۱۰/۳۳۲a	-۹/۷۷a	-۹/۷۷a	-۸/۷۷a	-۰/۷۷	-۰/۷۷
-۱۱/۷۷a	-۱۱/۷۷a	-۱۱/۳۳۲a	-۹/۷۷b	-۱۰/۷۷ab	-۹/۷۷b	-۹/۳۳۲b	-۰/۷۷	-۰/۷۷
(۳۲/۱۶)	(۲۰/۰۸)	(۲۰/۰۸)	(۳۰/۷۸)	(۰)	(۱۰/۳۴)	(۰)	(۷/۶۱)	
-۱۲/۷۷abc	-۱۱/۷۷bc	-۱۲/۰/bc	-۱۲/۳۳۲ab	-۱۲/۷۷a	-۱۱/۰c	-۱۱/۷۷c	-۰/۷۷	-۰/۷۷
(۴۴/۴۲)	(۲۰/۰۸)	(۲۰/۰۸)	(۳۰/۷۴)	(۲۹/۰۴)	(۱۳/۳۶)	(۱۳/۷۵)	(۲۸/۸۲)	
-۱۲/۳۳۲ab	-۱۲/۳۳۲ab	-۱۲/۳۳۲ab	-۱۲/۷۷ab	-۱۲/۰a	-۱۲/b	-۱۲/۷۷ab	-۰/۷۷	-۰/۷۷
(۰/۹۶)	(۳۲/۱۵)	(۳۲/۱۵)	(۰/۳۷/۷۵)	(۰/۲۰)	(۰/۴۰)	(۰/۲۴)	(۰/۱۶)	

\* میانگین‌ها توسط آزمون چند دامنه دانکن در سطح اختصاری ۵٪ مقایسه شده‌اند.

\* میانگین‌ها تردها و ارقام در هر یک از توانهای بالقوه و به طور مجرماً از سایر توانهای بالقوه ترسیم آزمون چند دامنه دانکن در سطح اختصاری ۵٪ مقایسه شده‌اند. هر ریف تفاوت بین هر دو میانگین که دارای حرف مشترک هستند از نظر آماری معنی‌دار نیست.

## منابع

- ۱- حاج رسولیها، شاپور، ۱۳۶۴. کیفیت آب برای کشاورزی، ترجمه، مرکز نشر دانشگاهی، تهران. ۱۳۷ صفحه.
- ۲- کلباسی، محمود، ۱۳۵۹. رشد گیاهان در زمینهای شور، ترجمه، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۴۹ صفحه.
- 3- Adriano, D.C., P.F Pratt and K.M. Holtzelaw. 1973. Comparison of two simple methods of chlorine analysis in plant materials. *Agron. J.*, 65:133-134.
- 4- Allen, S.G., A.K. Dobrenz, M.H. Shonhorst, and J.E. Stoner. 1985. Heritability of NaCl tolerance in germinating alfalfa seeds. *Agron. J.*, 77:99-101.
- 5- Balasubramanian. V., and S.K. Sinha. 1976. Effect of salt stress on growth, nodulation and nitrogen fixation in Cawpea and Mung beans. *Physiol. Plant.*, 36:197-200.
- 6- Brown. J.W., and H.E. Hayward. 1956. Salt tolerance of alfalfa varieties. *Agron. J.*, 48:18-21.
- 7- Brown, P.W., and C.B. Tanner. 1983. Alfalfa stem and leaf growth during water stress. *Agron.J.*, 75:799-805.
- 8- Christian, K.R. 1977. Effect of environment on the growth of alfalfa. *Advances in Agron.* 29:182-219.
- 9- Gorham, J., R.G. Wynjones., and E. Mc Donnell. 1985. Some mechanism of salt tolerance in crop plants. *Plant and Soil.*, 89: 15-40.
- 10- Joshi, S.S. 1984. Effect of salinity stress on organic and mineral constituents in leaves of Pigeopea. *Plant and Soil.*, 82:77-85.
- 11- Levit. J. 1980. Responses of plants to environmental stress. Vol. 2, Water, Radiation, Salt and other stress. Academic Press. U.S.A. 607p.
- 12- Lowell. E.V. 1964. Salinity in relation to irrigation. *Advance in Agron.*, 16:157-163.
- 13- Mass. E.V., and G.J. Hoffman. 1977. Crop salt tolerance. *Journal of the Irrigation and Drainage Division*, 103:115-135.
- 14- Mengel, K., and E.A. Kirk. 1982. Principles of plant nutrition. 3rd Edt. International Potash Institute. Bern. Switzerland. 655 p.
- 15- Nobel, C.L., G.M. Hillorn, and D.W. West. 1984. Identification and selection for salt tolerance in Lucerne (*Medicago sativa*). *Aust. Agric. Res.*, 35:239-252.

- 16- Peter, F., P.R.Clark, A.E.Laag, and P.F.Pratt. 1981. Salinity tolerance of the tree legumes: Mesquite (*prosopis glandulosa* var.*Torreyan*, *P.velotina* and *P.articulata*) Algarrobo (*P.chlensis*), Kiawe(*P.pallida*) and Tamarugo (*P. tamarugo*) growt in sand culture on nitrogen-free media. Plant and soil. 61:311-317.
- 17- Redman, R.E. 1974. Osmotic and specific ion effects on the germination of alfalfa. Can. J. Bot., 52:803-808.
- 18- Stone, S.J., D.B.Mark, and A.K.Dobrenz. 1979. Intraction of Sodium chloride and temperature on germination of two Alfalfa cultivars. Agron.J. 71:425-427.
- 19- Wageenet, R.J., T.J. Keck., W.F. Campbell and R.E. Krighton. 1984. Effect of water and salt stress on growth and acetylene reduction in alfalfa. Soil. Sci. Soc. Am.J., 48:1310-1316.
- 20- Waissman, N.A., and S.Miyamoto. 1987. Salt effects on Alfalfa emergence. Agron.J. 79:710-714.

